

## TRATAMIENTO PREPARACIÓN PAREJAS

Una vez tengamos elegidas las parejas con las que deseamos criar, y primero que nada, debemos aplicarles la gota de Ivermectina, para evitar durante toda la cría que nos aparezcan piojillos. Así mismo evitaremos la sarna de las patas. Esta gota, debe posteriormente de colocarse a los pichones que vayamos sacando, antes de colocarlos en la voladera, y una vez finalizada la cría, volveremos a repetir la aplicación a todos, para evitar que aparezcan los piojillos durante la muda y la época estival.

Iniciaremos el tratamiento suministrándoles Vermicida un solo día, para repetir con otro día a la semana siguiente. Después suministrando en el agua, actuaremos del modo siguiente:

- 7 días de Roxacín (antibiótico).
- 5 días de complejo vitamínico total.
- 5 días de Mold-Curb.
- 7 días de Roxacín.
- 5 días de complejo vitamínico.
- 5 días de Mold-Curb.

Posteriormente suministraremos durante 10 días Vitamina E, para seguidamente proceder a juntar las parejas.

Es importante suministrar durante toda la cría un complejo vitamínico en la pasta. Así mismo es también necesario suministrar en el agua sin parar Mold-Curb, aunque este producto no debe mezclarse con ningún otro, por lo que cuando nazcan los pichones, dejaremos de darlo hasta los dieciséis días de vida de los mismos, durante los cuales suministraremos Roxacín-

Recuerda que este tratamiento es orientativo.